作业1-第九章

姓名：郭嘉泉(20665020632)　班级：20助产6班　成绩：100

1(2.5分)【单选题】实施无痛肌内注射的措施，下列哪项不妥　得2.5分

A、患者侧卧位时上腿弯曲

B、注射刺激性强的药液时，针头要粗长

C、推注药液速度缓慢

D、同时注射两种药液时，应后注射刺激性强的药液

E、不在有硬结的部位进针

学生答案：A

参考答案：A

解析：无

2(2.5分)【单选题】患者发生青霉素过敏性休克时，最早、最常见的症状是　得2.5分

A、烦躁不安、血压下降

B、四肢麻木、头晕眼花

C、腹痛、腹泻

D、发绀、面色苍白

E、皮肤瘙痒、喉头水肿

学生答案：E

参考答案：E

解析：无

3(2.5分)【单选题】李某，18岁，患急性扁桃体炎，医嘱青霉素皮试。皮试后5min患者出现胸闷、气急伴濒危感，皮肤瘙痒,面色苍白，出冷汗,脉细速，血压下降，烦躁不安,考虑患者出现了何种情况　得2.5分

A、青霉素毒性反应

B、血清病型反应

C、呼吸道过敏反应

D、青霉素过敏性休克

E、皮肤组织过敏反应

学生答案：D

参考答案：D

解析：无

4(2.5分)【单选题】不符合破伤风抗毒素皮试结果阳性的表现是　得2.5分

A、局部皮丘红肿扩大

B、硬结直径为1cm

C、红晕大于4cm

D、皮丘周围有伪足、痒感
E、病人出现气促、发绀、荨麻疹
学生答案：B
参考答案：B
解析：无

5(2.5分)【单选题】臀大肌注射时,应避免损伤　得2.5分
A、臀部动脉
B、臀部静脉
C、坐骨神经
D、臀部淋巴
E、骨膜
学生答案：C
参考答案：C
解析：无

6(2.5分)【单选题】某新生儿出生16小时，接种卡介苗正确的方法是（ ）　得2.5分
A、三角肌下缘（ID）
B、三角肌下缘（H）
C、股外侧（H）
D、臀大肌（IM）
学生答案：A
参考答案：A
解析：无

7(2.5分)【单选题】患者徐某,64岁，患糖尿病10年，常规进行胰岛素6U，餐前30min,H,tid。选择合适的注射部位是　得2.5分
A、腹部
B、股外侧肌
C、臀大肌
D、前臂外侧
E、臀中、臀小肌
学生答案：A
参考答案：A
解析：无

8(2.5分)【单选题】破伤风抗毒素试验液的剂量是每毫升含　得2.5分

A、15U
B、20U
C、150U
D、200U
E、2500U
学生答案：C
参考答案：C
解析：无

9(2.5分)【单选题】抢救青霉素过敏性休克的首选药物是　　得2.5分
A、盐酸异丙嗪
B、去氧肾上腺素
C、盐酸肾上腺素
D、异丙肾上腺
E、去甲肾上腺素
学生答案：C
参考答案：C
解析：无

10(2.5分)【单选题】患者，男性，32岁，诊断为急性扁桃体炎。医嘱：青霉素过敏试验阴性后，肌内注射160万U青霉素。护士在问诊患者近期是否使用过青霉素时，得到哪种答复时需要再次做青霉素皮试　　得2.5分
A、已进行青霉素治疗，停药6小时
B、已进行青霉素治疗，停药12小时
C、已进行青霉素治疗，停药24小时
D、已进行青霉素治疗，停药3天
E、曾有过青霉素过敏史
学生答案：D
参考答案：D
解析：无

11(2.5分)【单选题】患儿1岁零8个月,因支气管炎需肌内注射青霉素,其注射部位最好选用　　得2.5分
A、臀大肌
B、臀中肌、臀小肌
C、上臂三角肌
D、前臂外侧肌
E、股外侧肌
学生答案：B

参考答案：B
解析：无

12(2.5分)【单选题】李某，患急性肺炎,注射青霉素数秒后，出现胸闷气促、面色苍白、脉细弱、出冷汗，血压：65/45mmHg，此时首先应采取的急救措施是　　得2.5分
A、立即通知医生
B、静脉注射0.1%盐酸肾上腺素
C、立即停药、平卧，皮下注射0.1%盐酸肾上腺素
D、立即吸氧，行胸外心脏按压
E、即刻注射强心剂
学生答案：C
参考答案：C
解析：无

13(2.5分)【单选题】下列皮试液中，0.1ml内含药物剂量错误的是　　得2.5分
A、链霉素　250u
B、青霉素　50u
C、破伤风毒素　150u
D、氨苄西林　0.5mg
E、普鲁卡因　0.25mg
学生答案：C
参考答案：C
解析：无

14(2.5分)【单选题】注射药物现用现配的主要目的是　　得2.5分
A、防止降低药物的效价
B、防止浪费药物
C、防止差错的发生
D、防止出现配伍禁忌
E、减少毒性反应
学生答案：A
参考答案：A
解析：无

15(2.5分)【单选题】每晚一次的外文缩写是　　得2.5分
A、qd
B、qm

C、qh
D、qn
E、Hs
学生答案：D
参考答案：D
解析：无

16(2.5分)【单选题】皮下注射给药，下述步骤哪项是错误的　　得2.5分
A、药液不足1ml可选择1ml注射器
B、注射部位可选择三角肌下缘
C、针头与皮肤呈10°～20°角进针
D、抽吸无回血后推注药液
E、注射毕用无菌干棉签轻压进针处，快速拔针
学生答案：C
参考答案：C
解析：无

17(2.5分)【单选题】肌内注射时，选用联线法进行体表定位,其注射区域正确的是　　得2.5分
A、髂嵴和尾骨联线的外上1/3处
B、髂嵴和尾骨联线的中1/3处
C、髂前上棘和尾骨联线的外上1/3处
D、髂前上棘和尾骨联线的中1/3处
E、髂前上棘和尾骨联线的后1/3处
学生答案：C
参考答案：C
解析：无

18(2.5分)【单选题】皮内注射时，枕头刺入深度应是针梗的（ ）　　得2.5分
A、1/3
B、2/3
C、1/2
D、针尖斜面
学生答案：D
参考答案：D
解析：无

19(2.5分)【单选题】患者刘某,因慢性充血性心力衰竭住院，医嘱:地高辛0.25mg,po,qd,护士发药时应特别注意　　得2.5分
A、嘱患者服药后多喝水
B、待患者服下后再离开
C、给药前应测量脉率
D、服药后不宜多喝水
E、应将药研碎再喂服
学生答案：C
参考答案：C
解析：无

20(2.5分)【单选题】静脉注射时止血带应扎在穿刺部位上方约　　得2.5分
A、2cm
B、4cm
C、6cm
D、8cm
E、10cm
学生答案：C
参考答案：C
解析：无

21(2.5分)【单选题】患者陈某，因结核性脑膜炎需注射链霉素，患者侧卧，正确的体位是　　得2.5分
A、下腿伸直，上腿稍弯曲
B、上腿伸直，下腿稍弯曲
C、双膝向腹部弯曲
D、两腿弯曲
E、两腿伸直
学生答案：B
参考答案：B
解析：无

22(2.5分)【单选题】有关无痛注射的叙述，错误的是　　得2.5分
A、解除思想顾虑
B、刺激性强的药物先注射
C、注意配伍禁忌
D、刺激性药物的针头宜粗长
E、注射时要两快一慢
学生答案：B

参考答案：B
解析：无

23(2.5分)【单选题】患者女，50岁。上呼吸道感染，医嘱口服磺胺药抗感染。护士嘱其服药后多饮水，目的是　　得2.5分
A、维持血液PH值
B、增强药物疗效
C、减轻胃肠道刺激
D、避免损坏造血系统
E、加快药物溶解避免结晶析出
学生答案：E
参考答案：E
解析：无

24(2.5分)【单选题】剧毒药瓶上的标签颜色是　　得2.5分
A、蓝色
B、红色
C、黑色
D、绿色
E、黄色
学生答案：C
参考答案：C
解析：无

25(2.5分)【单选题】患者，女性，35岁，因糖尿病住院治疗。医嘱：普通胰岛素8U，ac，H护士应为其执行的时间是　　得2.5分
A、上午
B、饭后
C、临睡前
D、饭前
E、必要时
学生答案：D
参考答案：D
解析：无

26(2.5分)【单选题】应放在4℃冰箱内保存的药物是（ ）　　得2.5分
A、氨茶碱

B、苯巴比妥钠
C、强的松
D、球蛋白
学生答案：D
参考答案：D
解析：无

27(2.5分)【单选题】某护士在病房发药时不慎将2床患者的维生素C0.2g发给了3床患者，发现错误后，护士应直接向谁汇报　　得2.5分
A、值班医生
B、科护士长
C、病房护士长
D、护理部主任
E、主班护士
学生答案：C
参考答案：C
解析：无

28(2.5分)【单选题】患者张某，需要口服磺胺类药，护士嘱咐其服药期间需多喝水的目的是　　得2.5分
A、减轻胃肠道刺激
B、增强药物疗效
C、维持血液pH
D、避免损害造血系统
E、增加药物溶解度，避免结晶析出
学生答案：E
参考答案：E
解析：无

29(2.5分)【单选题】静脉注射过程中,发现患者局部肿胀、疼痛、试抽有回血,可能的原因是　　得2.5分
A、静脉痉挛
B、针头刺入过深,穿破对侧血管壁
C、针头斜面一半在血管外
D、针头斜面紧贴血管内壁
E、针头刺入皮下
学生答案：C
参考答案：C
解析：无

30(2.5分)【单选题】超声波雾化器在使用中，水槽内水温超过一定温度应调换冷蒸馏水，此温度是　得2.5分
A、30℃
B、40℃
C、50℃
D、60℃
E、70℃
学生答案：C
参考答案：C
解析：无

31(2.5分)【单选题】下列有关超声雾化吸人的目的，不正确的叙述是　得2.5分
A、预防感染
B、解除痉挛
C、消除炎症
D、稀释痰液
E、缓解缺氧
学生答案：E
参考答案：E
解析：无

32(2.5分)【单选题】李某，18岁，患急性扁桃体炎，医嘱青霉素皮试。配制青霉素皮试液时,其皮内注射剂量为　得2.5分
A、10U
B、50U
C、100U
D、500U
E、2500U
学生答案：B
参考答案：B
解析：无

33(2.5分)【单选题】患者，男性，32岁，诊断为急性扁桃体炎。医嘱：青霉素过敏试验阴性后，肌内注射160万U青霉素。护士为患者肌内注射青霉素的操作要点错误的是
得2.5分
A、为避免患者疼痛可在双侧臀部交替注

B、注射前必须确认患者的过敏试验结果
C、使用一次性的注射器不可将针梗全部刺入
D、第一次注射青霉素后可直接回家休息
E、严格按医嘱注射剂量
学生答案：D
参考答案：D
解析：无

34(2.5分)【单选题】患者李某,66岁,因老年慢性支气管炎,痰液黏稠不易咳出，为帮助患者祛痰,给予氧气雾化吸入，下列操作中错误的一项是　得2.5分
A、吸入前嘱患者先漱口
B、用蒸馏水稀释药液在15ml以内
C、氧气流量为6～8L/min
D、雾化吸入器进气口接氧气,湿化瓶中加入蒸馏水
E、嘱患者呼气时,移开出气口
学生答案：D
参考答案：D
解析：无

35(2.5分)【单选题】剧毒药和麻醉药最主要的保管原则是（ ）　得2.5分
A、与内服药分别放置
B、放阴凉处
C、装密封瓶中保存
D、应加锁并专人保管，认真交班
学生答案：D
参考答案：D
解析：无

36(2.5分)【单选题】发挥药效最快的给药途径是（ ）　得2.5分
A、口服给药
B、皮肤黏膜给药
C、吸入给药
D、静脉注射
学生答案：D
参考答案：D
解析：无

37(2.5分)【单选题】每日两次的外文缩写是　　得2.5分
A、tid
B、qid
C、bid
D、ac
E、qod
学生答案：C
参考答案：C
解析：无

38(2.5分)【单选题】一次性的注射器和针头，下列哪些部位可用手直接接触　　得2.5分
A、乳头、针梗
B、活塞、针栓
C、空筒、活塞
D、针尖、活塞柄
E、活塞柄、针栓
学生答案：E
参考答案：E
解析：无

39(2.5分)【单选题】执行给药原则中，首要的是（ ）　　得2.5分
A、遵医嘱给药
B、给药途径要准确
C、给药时间要准确
D、给药过程中要观察疗效
学生答案：A
参考答案：A
解析：无

40(2.5分)【单选题】应放在4℃冰箱内保存的药物是（ ）　　得2.5分
A、氨茶碱
B、苯巴比妥钠
C、强的松
D、球蛋白
学生答案：D
参考答案：D
解析：无